



Qualité des variétés de lin de l'Ouest canadien 2012

Les données ont été obtenues dans le cadre de l'enquête sur le lin récolté dans l'Ouest canadien en 2012 menée par le Laboratoire de recherches sur les grains. Il s'agit d'un programme annuel volontaire; des échantillons de lin sont soumis à la Commission canadienne des grains par des producteurs, des sociétés céréalères et des usines de trituration, tout au long de la récolte.

Étant donné les variations importantes du nombre d'échantillons ainsi que la distribution des échantillons des différentes variétés pour une année donnée, il est possible que les résultats ne soient pas complètement représentatifs de la performance de ces variétés. Les données doivent être vues comme une indication de la performance possible d'une variété, et non comme une description de la qualité de cette variété.

Ce rapport est fondé sur l'analyse d'échantillons composites faits à partir d'échantillons de Lin, Ouest et Est canadien (OC/EC) n° 1 de la même variété et cultivé dans la même province. Les résultats présentés portent sur les paramètres qualitatifs suivants : teneur en huile, teneur en protéines, composition en acides gras et indice d'iode.

Qualité des composés par province et variété

Manitoba

Ce tableau contient : le nom des variétés, le nombre d'échantillons, les teneurs en huile, en protéines et en acides gras libres

Variété ¹	Nombre d'échantillons	Teneur en huile ²	Teneur en protéines ³	Teneur en acides gras libres ⁴
CDC Bethune	16	43,6	26,1	0,23
CDC Sorrel	14	43,8	25,3	0,21
Hanley	5	42,3	26,3	0,12
Lightening	6	45,5	24,8	0,16
Taurus	6	45,1	23,9	0,16
Moyenne		44,1	25,3	0,18
Total	47			

Saskatchewan

Ce tableau contient : le nom des variétés, le nombre d'échantillons, les teneurs en huile, en protéines et en acides gras libres

Variété ¹	Nombre d'échantillons	Teneur en huile ²	Teneur en protéines ³	Teneur en acides gras libres ⁴
CDC Arras	6	44,9	22,7	0,12
CDC Bethune	75	45,6	21,9	0,12
CDC Sorrel	43	45,4	21,6	0,15
Taurus	11	45,5	22,3	0,15

Vimy	16	45,3	23,0	0,13
Moyenne		45,3	22,3	0,13
Total	151			

¹ Indiquée par le producteur

² Teneur sèche

³ % N x 6.25; teneur sèche

⁴ Pourcentage d'acides gras libres, exprimé comme pourcentage d'acide oléique

Composition en acides gras et indice d'iode des composés par province et variété

Manitoba

Ce tableau contient : la composition en acides gras et l'indice d'iode.

Variété ¹	Nombre d'échantillons	Indice d'iode ² (Unités dans l'huile)	Composition en acides gras ³ (% dans l'huile)				
			C16:0	C18:0	C18:1	C18:2	C18:3
CDC Bethune	16	185	4,8	3,7	22,0	14,6	53,6
CDC Sorrel	14	189	5,0	3,6	20,4	13,3	56,5
Hanley	5	193	5,4	2,8	16,8	16,9	57,0
Lightening	6	189	4,7	3,7	19,7	15,2	55,6
Taurus	6	189	5,1	3,0	20,5	14,2	56,1
Means		189	5,0	3,4	19,9	14,8	55,8
Total	47						

Saskatchewan

Ce tableau contient : la composition en acides gras et l'indice d'iode.

Variété ¹	Nombre d'échantillons	Indice d'iode ² (Unités dans l'huile)	Composition en acides gras ³ (% dans l'huile)				
			C16:0	C18:0	C18:1	C18:2	C18:3
CDC Arras	6	189	5,7	3,8	18,4	15,0	56,0
CDC Bethune	75	191	4,9	3,4	19,0	15,4	56,3
CDC Sorrel	43	193	5,1	3,3	18,3	13,8	58,5

Taurus	11	191	5,3	2,8	20,0	13,9	57,0
Vimy	16	192	5,4	3,5	18,0	14,4	57,8
Means		191	5,3	3,3	18,8	14,5	57,1
Total	151						

¹ Indiquée par le producteur

² Calculé à partir de la composition en acide gras

³ Pourcentage d'acides gras, incluant : acide palmitique (C16:0), acide stéarique (C18:0), acide oléique (C18:1), acide linoléique (C18:2), acide linoléique (C18:3), acide arachidique (C20:0), acide eicosénoïque (C20:1), acide behénique (C22:0), et acide lignocérique (C24:0)